



ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD




Климатолошка анализа за 2016. годину

Милица Ђорђевић
Владимир Тркуља

Средња годишња температура за 2016. годину


У односу на просјек (период 1981-2010. година*) 2016. година је била топлија, а то је било поготово изражено у првом дијелу године. Средња годишња температура је имала вриједности од 7.1°C на Чемерну, а 15.1°C у Требињу. У вишим предјелима средња температура је била од 7.1°C до 10.1°C. У већини крајева је била од 10.3°C до 12.8°C, а на југу Херцеговине до 15.1°C.

* просјек се односи на расположиве податке из периода 1981-2010.




Средња температура по годишњим добима


Зима




Прољеће



Љето



Јесен




Током зиме и првог дијела прољећа било је врло топло, а фебруар мјесец је био један од најтоплијих фебруара од кад се врше мјерења. У мају мјесецу је било хладније уз честе падавине. Почетком љета је поново било топло, али ове године су изостале велике врућине и екстремно високе температуре преко 40 степени. Љето је било промјенљиво уз честе падавине, а током августа је било хладније уз честе и повремено обилне падавине. Једино је на југу Херцеговине у августу било врло топло и претежно суво. Јесен је била просјечна, мало је било топлије током септембра и новембра, а хладније током октобра. Почетак зиме је био у знаку сувог и хладног времена.

Средња температура по мјесецима за 2016. годину

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	Средња темп. за 2016
Дринић	1.25	4.30	3.71	9.14	10.85	16.48	18.83	16.76	13.53	7.52	5.65	0.30	9.03
Рибник	2.34	7.13	6.12	11.62	14.08	19.00	21.01	18.36	15.50	9.93	7.45	0.64	11.10
Мраковица	1.88	4.61	4.39	10.86	12.82	18.31	19.99	17.49	15.65	8.07	5.64	0.91	10.05
Нови Град	1.41	6.34	7.20	12.26	15.17	20.17	22.39	19.84	17.29	10.06	7.10	-0.14	11.59
Приједор	1.25	6.82	7.75	12.93	16.03	21.17	23.30	20.56	17.70	10.40	7.18	-0.20	12.07
Србац	1.11	6.12	7.58	12.93	15.66	20.95	22.71	20.31	17.34	10.10	6.72	0.18	11.81
Градишка	1.89	6.99	7.69	13.36	16.36	21.42	23.20	20.26	18.11	10.71	7.77	0.27	12.33
Бања Лука	2.29	7.60	8.01	13.45	16.20	21.53	23.28	20.47	17.78	10.62	7.37	0.45	12.42
Мркоњић Град	1.55	6.28	5.38	11.59	13.32	18.41	20.43	17.83	14.87	8.90	5.83	-0.26	10.34
Шипово	1.10	6.37	5.57	11.42	13.06	18.43	20.82	18.18	15.01	8.95	5.58	-0.78	10.31
Добој	1.84	7.58	7.84	13.33	15.85	21.67	23.04	20.15	17.20	10.49	7.37	0.37	12.22
Бијељина	1.95	8.06	8.18	13.85	16.62	21.99	23.53	21.23	18.35	10.58	7.02	0.76	12.67
Зворник	2.10	7.42	7.94	13.38	15.48	20.51	22.34	19.40	16.99	10.46	7.16	0.81	12.00
Сребреница	1.23	7.44	6.45	12.53	13.85	18.93	20.18	18.06	15.53	9.90	6.51	-0.79	10.81
Хан Пијесак	-1.92	3.29	1.60	8.86	9.97	15.45	17.08	14.82	12.14	6.23	2.84	-2.04	7.36
Гацко	0.54	4.64	4.04	9.83	11.10	16.40	19.63	17.85	13.50	8.80	4.79	-0.57	9.22
Чемерно	-1.71	2.76	1.37	8.60	8.69	14.54	16.62	15.02	11.86	7.00	2.66	-1.87	7.13
Соколац	-1.62	4.20	3.03	9.91	11.14	16.69	18.04	15.72	12.32	7.05	2.88	-2.74	8.05
Калиновик	-0.70	4.43	2.54	9.49	10.07	15.92	17.72	15.95	12.29	7.44	3.66	-1.30	8.12
Вишеград	0.40	6.84	7.04	13.52	14.82	20.95	22.32	20.13	16.76	10.75	5.59	-1.52	11.46
Рудо	-0.60	6.91	6.53	13.49	14.18	20.74	21.61	19.88	16.17	10.13	4.98	-2.21	10.98
Фоча	0.56	7.34	6.43	12.49	13.39	19.05	20.78	18.56	15.64	10.26	5.47	-1.57	10.69
Билећа	3.76	7.87	7.90	13.19	14.42	20.31	23.88	22.60	17.19	12.14	8.00	2.31	12.80
Требиње	6.15	10.07	9.81	15.08	16.38	22.37	26.36	24.51	19.68	14.35	10.18	5.76	15.07




Бања Лука



Почетак године је био у знаку врло топлог времена, поготово у јануару и фебруару. Други дио љета је био хладнији од просјека. Јесен је била просјечна, а зима је почела са више хладних дана.

	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Тср
1981-2010	0.6	2.3	6.8	11.5	16.5	19.8	21.8	21.2	16.6	11.7	6.3	2.1	11.4
2016	2.3	7.6	8.0	13.5	16.2	21.5	23.3	20.5	17.8	10.6	7.4	0.4	12.4


Приједор



У Приједору температура током цијеле године је била око вишегодишњег просјека. Почетком године је било знатно топлије од просјека. Свјежије вријеме је почело од августа и трајало је до краја године, осим у новембру када је било топлије.

	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Тср
1981-2010	0.3	2.1	7.3	12.4	17.3	20.2	22.6	21.7	17.5	12.0	5.5	2.1	11.7
2016	1.2	6.8	7.8	12.9	16.0	21.2	23.3	20.2	17.7	10.4	7.2	-0.2	12.0

Добој




У Добоју средња годишња температура је била за степен виша од просјека. Почетком године је било врло топло. Топло је било и у јуну и јулу, а нешто свјежије у августу.

Јесен је била просјечна, октобар је био мало хладнији а новембар топлији од просјека. Зима је почела у знаку хладнијег времена.

	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Тср
1981-2010	0.2	1.9	6.7	11.5	16.1	19.1	21.2	20.5	16.6	11.3	5.8	2.0	11.1
2016	1.8	7.6	7.8	13.3	15.9	21.7	23.0	20.1	17.2	10.5	7.4	0.4	12.2

Бијељина




Средња годишња температура у Бијељини је била за 1.2°C виша од просјека. Почетком године је било врло топло. Топло је било и у јуну и јулу, а август је био просјечан (нешто топлији од осталих предјела).

Јесен је била просјечна, октобар је био мало хладнији а новембар мало топлији од просјека. У децембру је било знатно хладније од просјека.

	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Тср
1981-2010	0.3	1.9	6.9	11.8	16.9	19.9	22.1	21.2	17.2	11.6	6.0	2.3	11.5
2016	2.0	8.1	8.2	13.8	16.6	22.0	23.5	21.2	18.4	10.6	7.0	0.8	12.7

Соколац




Средња годишња температура у Сокоцу је била за степен виша од просјека. Почетком године је било врло топло. Фебруар је био чак 6 степени топлији од просјека. Врло топло је било и у априлу.

Топло је било и у јуну и јулу, а свјежије у августу. Јесен је била просјечна. Децембар је био мало хладнији, за разлику од осталих предјела гдје је због магле било знатно хладније.


	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Тср
1981-2010	-3.5	-1.9	2.4	6.9	11.8	14.7	17.0	16.3	12.5	7.7	1.9	-2.0	7.0
2016	-1.6	4.2	3.0	9.9	11.1	16.7	18.0	15.7	12.3	7.1	2.9	-2.7	8.1

Билећа



	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Тср
1981-2010	3.2	3.9	7.1	11.5	15.8	19.4	22.2	22.3	18.2	12.7	7.3	4.1	12.3
2016	3.8	7.9	7.9	13.2	14.4	20.3	23.9	22.6	17.2	12.1	8.0	2.3	12.8

Требиње



На југу Херцеговине утицај медитеранске климе је најизраженији. Топло је било у првом дијелу године, а од августа до краја године свјежије. Све укупно средња температура је била мало виша од просјека.

	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Тср
1981-2010	5.6	5.9	8.5	13.2	17.6	20.9	24.3	24.3	19.8	15.3	10.6	7.0	14.4
2016	6.2	10.1	9.8	15.1	16.4	22.4	26.4	24.5	19.7	14.3	10.2	5.8	15.1


Средња годишња минимална температура

Због врло топлог времена у јануару и фебруару средња минимална температура током цијеле године је била знатно изнад просјека.

Најнижа температура се јавила у јануару и износила је од -22.3°C колико је било у Сокоцу и -21.2°C у Калиновику до -4.6°C у Требињу.

Појава касног прољећног мрза крајем априла узроковала је велике штете на воћарским културама, поготово на западу Републике Српске.


Минимална температура 26. априла износила је од -8.6°C у вишим предјелима Крајине, а до 4.7°C на југу Херцеговине.



Средња годишња максимална температура

Средња максимална температура током цијеле године је била ближа просјеку. Почетком године је било врло топлих дана, поготово при јаком јужном вјетру.

Током љета изостале су велике врућине и температуре преко 40°C . Апсолутна максимална температура је износила од 27.8°C на Чемерну и до 38.8°C у Вишеграду.





Бања Лука

Колико је било топло у фебруару види се из средње минимане и максималне температуре. Средња максимална је била већа у фебруару него у марту.

Апсолутна минимална температура је износила -11°C и јавила се 23. јануара.

Апсолутна максимална температура је износила 37.3°C и јавила се 12. јула.





Приједор

Током 2016. године није било јаких мразева, али ни екстремно високих температура.

Апсолутна минимална температура је износила -11.2°C и јавила се 23. јануара.



Апсолутна максимална температура је износила 36.6°C и јавила се 12. јула.



Добој

У Добоју се јавио нешто јачи мраз у односу на остале предјеле. 4. јануара је измјерено $-16,3^{\circ}\text{C}$.



Апсолутна максимална температура је износила $38,0^{\circ}\text{C}$ и јавила се 13. јула.



Бијељина

Апсолутна минимална температура је износила -14.3°C и јавила се 4. јануара.

Апсолутна максимална температура је износила 35.8°C и јавила се 13. јула





Соколац

Најнижа температура се и ове године јавила у Сокоцу.

Апсолутна минимална температура је износила -22.3°C и јавила се 20. јануара. То је био једини дан у години са температуром испод -20°C .

Апсолутна максимална температура је износила 31.2°C и јавила се 13. јула.





Билећа

Током 2016. године није било јаких мразева, али ни екстремно високих температура.

Апсолутна минимална температура је износила -10.4°C и јавила се 23. јануара.

Апсолутна максимална температура је износила 34.4°C и јавила се 23. јуна. Максимална температура у јулу и августу била је око 34°C .





Требиње

Током 2016. године није било јаких мразева, али ни екстремно високих температура.

Апсолутна минимална температура је износила -4.6°C и јавила се 19. јануара.

Апсолутна максимална температура је износила 35.6°C и јавила се 23. јуна.


У јулу и августу је било топло уз пуно дана са температуром изнад 30 степени, али није било великих врућина. Максимална температура у јулу и августу била је око 35°C .



Бања Лука

У посљедњих десет година све је рјеђа појава врло хладних мјесеци.
Фебруар 2012. је био најхладнији мјесец са средњом температуром од -2.8°C .
Децембар 2016. је био најхладнији децембар у посљедњих 10 година, а фебруар 2016. најтоплији фебруар.
Јул 2012. и јул 2015. су били најтоплији мјесеци са средњом температуром од 25.2°C .

Преглед средњих мјесечних температура за
Бањалуку 2007-2016




Приједор

И у Приједору фебруар 2012. је био најхладнији мјесец у посљедњих 10 година са температуром од -3.1°C .

Децембар 2016. је био најхладнији децембар у посљедњих десет година и трећи најхладнији мјесец у том периоду. Најтоплији мјесец је био јул 2012. са средњом температуром од 24.8°C .

Врло топло је било и љето 2015.

Преглед средњих мјесечних температура за
Приједор 2007-2016




Добој

И у Добоју фебруар 2012. је био најхладнији мјесец у посљедњих 10 година са температуром од -3.5°C .

Децембар 2016. је био најхладнији децембар у посљедњих десет година, а фебруар најтоплији у том периоду. Најтоплији мјесец је био јул 2012. са средњом температуром од 24.9°C .

Врло топло је било и љето 2015.


Преглед средњих мјесечних температура за
Добој 2007-2016



Бијељина

У последњих десет година све је рјеђа појава врло хладних мјесеци, а само је два пута средња мјесечна температура била испод нуле. И у Бијељини фебруар 2012. је био најхладнији мјесец у посљедњих 10 година са температуром од -3.3°C . Фебруар 2016. је био најтоплији фебруар у посљедњих десет година. Најтоплији мјесец је био јул 2012. са средњом температуром од чак 26.0°C . Врло топло је било и љето 2015.


Преглед средњих мјесечних температура за
Бијељину 2007-2016



Соколац

У Сокоцу фебруар 2012. је био најхладнији мјесец у посљедњих 10 година са температуром од -7.2°C , а врло хладно је било и у јануару исте године. Децембар 2016. је био други најхладнији децембар (послије 2007. године). Фебруар 2016. је био други најтоплији фебруар у посљедњих десет година (послије 2014. године). Најтоплији мјесец је био јул 2012. са средњом температуром од 20.4°C . Врло топло је било и љето 2015.

Преглед средњих мјесечних температура за
Соколац 2007-2016




Билећа

И у Херцеговини је фебруар 2012. је био најхладнији мјесец у посљедњих 10 година, а тада је пала и највећа количина снијега. Средња мјесечна температура била је од 0.2°C и то је једини мјесец са средњом температуром испод нуле.

Децембар 2016. је био најхладнији децембар у посљедњих десет година, а фебруар 2016. најтоплији фебруар у посљедњих десет година. Најтоплији мјесец је био јул 2015. са средњом температуром од 25.7°C, а врло топло је било и љето 2012.

Преглед средњих мјесечних температура за
Билећу 2007-2016




Требиње

Требиње је најтоплије мјесто у Републици Српској уз најјачи утицај медитеранске климе. И у Требињу фебруар 2012. године је био најхладнији мјесец у посљедњих 10 година са средњом температуром од 3.0°C.

Фебруар 2016. године био је најтоплији фебруар у посљедњих десет година. Најтоплији мјесец је био јул 2015. године са средњом температуром од чак 28.4°C, а врло топло је било и лјето 2012. године.

Преглед просјечних температура за
Требиње 2007-2016



Ледени дани

Број ледених дана 2016. године (дани са температуром испод нуле током цијелог дана) је био врло мали. У фебруару (који је зимски мјесец) није било ледних дана у већини предјела, само је на појединим планинама било пар ледених дана.

У децембру је било више лединих дана поготово у предјелима са цјелодневном маглом.

[illegible]

Мразни дани

Број мразних дана (дани са минималном температуром испод нуле) је био ближи просјеку. Највише мразних дана је било у јануару и децембру, знатно мање у фебруару.

Појава касног прољећног мраза крајем априла нањела је велике штете воћарским културама.

[illegible]

Љетни дани

Број љетњих дана (дани са максималном температуром изнад 25 степени) је био знатно већи од просјека. Током љета било је прилично љетњих дана тј. било је пријатно топло.

Више љетњих дана је било у септембру него у мају.

	Јан	Феб	Март	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	2016
Бања Лука			1	10	10	26	27	24	17	2			117
Добој			1	11	9	27	27	23	16	2			116
Бијељина			1	9	9	25	28	25	17	2			116
Приједор				10	10	27	27	24	18	2			118
Нови Град				5	9	24	27	22	16	1			104
Рибник				8	8	22	26	20	15	3			102
Дринић					3	5	20	10	6				44
Мраковица					4	7	15	3	2				31
Градишка				8	10	26	28	24	16	1			113
Србац			1	7	10	25	26	23	16	1			109
Мркоњић Град				6	5	15	26	19	13	1			85
Шипово				8	5	19	28	19	14	2			95
Сребреница			1	9	7	15	26	20	14				92
Хан Пијесак					1	4	11	3					19
Соколац				1	2	12	21	13	3				52
Вишеград			1	16	9	27	28	25	15	2			123
Рудо			1	12	8	25	28	22	14				110
Фоча				10	8	19	28	21	14				100
Чемерно						3	8	2					13
Гацко					3	12	22	20	3				60
Билећа				5	4	17	29	28	14				97
Требиње				5	7	20	30	31	21	2			116

Тропски дани

Број тропски дана (дани са температуром изнад 30 степени) је био око просјека. Највише врло топлих дана је било током јула, а у августу знатно мање када је било више хладних и кишовитих дана.

У односу на претходних пар година љето 2016. је било свјежије и без великих врућина.

	Јан	Феб	Март	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	2016
Бања Лука					3	6	17	8	5				39
Добој				1	2	7	17	6	3				36
Бијељина				1	3	8	16	8	9				45
Приједор					3	6	18	7	6				40
Нови Град					3	4	17	4	1				29
Рибник					2	4	15	4					25
Дринић							4	1					5
Мраковица							3						3
Градишка					2	5	14	2	2				25
Србац					2	5	14	3	1				25
Мркоњић Град					1	3	15	2					21
Шипово					1	4	15	2					22
Сребреница					1	3	10	1					15
Хан Пијесак													0
Соколац							4						4
Вишеград				6	5	13	21	19	6				70
Рудо				3	3	11	20	11	2				50
Фоча					1	9	16	8					34
Чемерно													0
Гацко						1	5	2					8
Билећа						5	22	20	3				50
Требиње						11	27	24	5				67


Тропске ноћи

Тропских ноћи (минимална температура изнад 20 степени) је било само неколико, више у јуну и понегдје у јулу.

Само је на крајњем југу Херцеговине било више тропских ноћи.

	Јан	Феб	Март	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	2016
Бања Лука						3							3
Добој						2							2
Бијељина						4	3						7
Приједор						1							1
Нови Град						3	1						4
Рибник						1							1
Дринић													0
Мраковица							6						6
Градишка						4	5						9
Србац						4	1						5
Мркоњић Град						1							1
Шипово						1							1
Сребреница						2							2
Хан Пијесак													0
Соколац													0
Вишеград						2							2
Рудо						1							1
Фоча						4							4
Чемерно													0
Гацко													0
Билећа						3	3						6
Требиње						9	16	15	2				42

Годишња количина падавина



У првом дијелу године било је обилнијих падавина, поготово током зиме. Због топлог времена падала је чешће киша а не снијег. Током прољећа било је доста падавина, а обилна киша се јавила на истоку. Љето је било кишовито уз честе, повремено и обилније падавине.

Једино је у Херцеговини љето било сушно, поготово током августа када скоро да није ни било падавина. Током јесени у већини предјела падавина је било мање од просјека, осим на југу и понегдје на истоку гдје је било врло обилних падавина у октобру.


Децембар је био врло сушан. Количина падавина у децембру је била мања од 10mm у већини предјела. Ово је било један од најсушнијих децембара икада, а занимљиво је да се иста ситуација десила прошлог децембра, као и 2013. године, а прије тога 1972. године.

Укупна количина падавина по мјесецима за 2016. годину

	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	Укупно 2016
Дринић	54.7	272.7	109.5	70.9	144.4	105.0	75.7	76.7	109.5	94.2	85.7	1.7	1201
Рибник	81.2	131.6	133.5	67.1	122.7	55.5	118.6	104.8	97.8	121.1	73.1	8.8	1116
Мраковица	61.4	125.4	120.2	63.0	137.1	95.0	174.2	136.1	117.9	84.3	70.2	0.6	1185
Нови Град	84.7	162.1	111.7	64.7	131.2	130.9	70.0	84.2	73.2	96.2	94.1	5.6	1109
Приједор	101.3	137.3	103.5	64.7	112.4	64.8	117.1	68.0	55.5	78.9	94.7	5.4	1004
Србац	22.4	43.0	77.5	60.5	40.1	106.2	107.4	55.7	95.7	64.5	90.2	1.0	764
Градишка	85.5	107.5	94.4	70.4	78.9	67.8	86.3	99.1	97.6	71.7	70.7	8.9	939
Бања Лука	109.7	108.5	112.2	70.5	100.6	117.8	125.9	100.2	63.3	76.0	68.9	5.0	1059
Мркоњић Град	74.9	124.7	156.7	75.7	93.4	69.6	59.8	96.8	87.0	102.4	90.9	9.5	1042
Шипово	63.0	70.7	123.6	50.7	71.8	65.0	46.5	98.4	58.4	108.7	95.0	10.2	862
Добој	89.5	96.9	116.9	78.0	86.5	47.5	154.4	82.8	69.3	62.3	70.5	5.2	960
Бијељина	70.5	50.7	120.5	61.8	86.4	120.7	84.8	66.0	52.4	58.2	64.4	3.3	840
Зворник	88.5	63.5	139.8	95.6	67.1	110.3	99.7	167.0	61.8	74.9	81.0	7.0	1056
Сребреница	69.1	52.8	204.6	92.6	114.5	141.7	104.1	198.3	71.7	117.9	109.1	9.4	1286
Хан Пијесак	85.8	61.0	204.3	112.0	186.9	205.4	133.5	173.3	73.4	124.5	119.6	18.1	1498
Гацко	204.1	309.3	246.6	95.1	197.5	117.9	52.2	36.8	69.0	211.5	249.4	1.3	1791
Чемерно	142.4	240.7	211.3	131.5	212.3	133.4	73.5	41.5	80.2	221.1	208.0	8.3	1704
Соколац	59.1	57.8	186.4	72.7	70.4	158.9	130.3	95.7	67.3	117.7	107.7	10.7	1135
Калиновик	100.0	130.6	262.5	98.0	165.3	102.2	59.0	33.7	70.1	164.2	137.7	15.9	1339
Вишеград	56.3	43.9	190.8	40.9	73.5	122.3	115.6	80.1	42.6	113.4	87.3	7.5	974
Рудо	48.9	48.9	254.4	49.4	93.1	86.9	81.2	66.7	43.7	94.1	83.9	8.4	960
Фоча	59.5	101.8	240.7	98.7	109.0	154.8	127.1	88.0	57.5	153.0	138.5	11.0	1340
Билећа	186.2	206.4	212.6	115.5	180.2	192.1	60.3	5.6	116.6	236.5	189.0	0.5	1702
Требиње	199.7	154.0	249.8	124.0	130.6	81.9	18.0	1.6	86.3	304.1	186.8	1.9	1539

0.5  309.3

Годишња количина падавина по станицама за 2016. годину




Падавине нису биле равномјерно распоређене током године и по регионима. Количина падавина на западу је била око и мало изнад просјека, док је на истоку било знатно више падавина од просјека (повремено је било и обилних падавина), а у Херцеговини је количина падавина била мало мања од просјека.

Број дана са падавинама

Цијела година је била промјенљива уз честе падавине. Пуно падавина је било и током љета, само је на југу било сушно током љета. Мање падавина је било током јесени, а децембар је био врло сушан. Све укупно број дана са падавинама у већини предјела је био већи од просјека.

	Јан	Феб	Март	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	2016
Бања Лука	12	17	20	12	16	13	10	9	8	15	13	6	151
Добој	13	16	16	11	17	13	8	11	6	15	13	5	144
Бијељина	17	16	17	10	15	14	7	11	6	16	11	3	143
Приједор	8	13	17	9	13	8	7	11	5	10	10	4	115
Нови Град	11	16	20	14	17	11	8	12	7	14	12	4	146
Рибник	16	15	22	11	17	15	10	12	11	16	15	8	168
Дринић	10	15	16	11	14	14	9	9	8	11	11	3	131
Мраковица	8	15	16	10	13	9	8	8	6	10	9	1	113
Градишка	9	13	13	11	17	15	8	7	8	11	7	4	123
Србац	9	14	16	12	17	10	11	8	9	13	12	3	134
Мркоњић Град	11	15	18	12	17	12	8	12	11	15	14	8	153
Шипово	9	14	17	10	14	10	8	10	9	12	13	8	134
Сребреница	16	13	16	11	17	13	7	12	6	14	13	6	144
Хан Пијесак	21	15	18	10	20	22	12	13	10	19	14	10	184
Соколац	19	11	15	10	19	15	13	12	8	14	14	5	155
Вишеград	19	15	18	10	16	14	9	12	11	16	13	5	158
Рудо	12	12	18	10	18	14	9	9	10	15	11	5	143
Фоча	12	13	16	9	18	15	8	13	12	12	11	5	144
Чемерно	18	23	20	10	19	14	10	9	13	14	14	3	167
Гацко	17	20	16	11	17	14	6	8	10	13	14	2	148
Билећа	14	19	16	10	13	12	3	6	13	13	12	1	132
Требиње	15	19	19	10	13	10	4	3	12	14	16	2	137

Бања Лука




Од почетка године до септембра било је много падавина, током лета повремено је било и обилних падавина. Почетком јануара било је пуно снијега 48cm али због тоглог времена снијег се брзо отопио, а већи дио зиме падала је киша.

Од септембра до краја године било је мање падавина, а децембар је био врло сушан. Све укупно количина падавина током цијеле године била је око просјека.



	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Сума
1981-2010	69.7	59.1	87.5	84.3	89.4	112.4	81.4	77.1	97.9	87.3	92.1	96.4	1034.6
2016	109.7	108.5	112.2	70.5	100.6	117.8	125.9	100.2	63.3	76.0	68.9	5.0	1058.7

Приједор



Падавине током 2016. године нису биле равномјерно распоређене али током већег дијела године било је јачих падавина. Почетком јануара пао је велики снијег 45cm, али се брзо отопио и већи дио зиме је падала киша.

И љето је било промјенљиво уз честу кишу, која је у јулу била и обилнија.


Јесен је била просјечна, а децембар је био врло сушан уз занемарљиво малу количину падавина.

Све укупно количина падавина током цијеле године била је већа од просјека за 110 mm.



	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Сума
1981-2010	63.3	49.7	65.9	77.5	81.5	87.5	61.6	72.0	102.1	74.4	79.8	75.5	890.8
2016	101.3	137.3	103.5	64.7	112.4	64.8	117.1	68.0	55.5	78.9	94.7	5.4	1003.5

Добој




Почетком године у Добоју је било обилних падавина. Почетком јануара пало је пуно снијега, 45cm, али због топлог времена снијег се брзо отопио и већи дио зиме падала је киша.

Од априла до јуна било је нешто мање падавина, а у јулу и августу је поново било јачих падавина. Јесен је била просјечна, а као и у осталим предјелима децембар је био врло сушан. Све укупно количина падавина током цијеле године била је око просјека.



	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Сума
1981-2010	58.8	53.4	67.9	74.6	92.7	117.3	95.5	69.1	77.7	72.5	76.5	75.9	931.9
2016	89.5	96.9	116.9	78.0	86.5	47.5	154.4	82.8	69.3	62.3	70.5	5.2	959.8

Бијељина



Почетком године у Бијељини није било обилних падавина. У јануару у неколико дана пало је доста снијега до 30cm, али због топлог времена снијег се брзо отопио. Јаче и обилније падавине су се јавиле у марту, и у периоду од маја до краја љета.


Љето је било промјенљиво уз честу појаву кише.

Јесен је била просјечна, а децембар врло сушан. Све укупно количина падавина током цијеле године била је нешто већа од просјека.



	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Сума
1981-2010	54.1	43.5	59.7	66.1	68.2	100.0	74.6	60.7	55.8	67.6	64.0	63.9	778.2
2016	70.5	50.7	120.5	61.8	86.4	120.7	84.8	66.0	52.4	58.2	64.4	3.3	839.6

Соколац




У источним предјелима и у Сокоцу количина падавина током цијеле године била је знатно већа од просјека. Почетком године на истоку није било пуно падавина, а и падало је знатно мање снијега него на сјеверу и западу. У марту је било врло обилних падавина. Снијег је падао крајем априла.

Љето је било кишовито уз честе обилне падавине. Јачих падавина је било и током јесени у октобру и новембру, а као и у већини предјела децембар је био врло сушан.



	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Сума
1981-2010	52.7	52.9	56.8	65.3	73.9	93.7	74.9	72.1	80.2	78.0	88.6	69.9	859.0
2016	59.1	57.8	186.4	72.7	70.4	158.9	130.3	95.7	67.3	117.7	107.7	10.7	1134.7


Билећа



Распоред падавина у Херцеговини је другачији у односу на остале предјеле због утицаја медитеранске климе. Љета су сушна, а обилније падавине се јављају у јесен и зиму. У Билећи је почетком године било обилнијих падавина, а тај тренд се наставио и током прољећа и почетком љета.


У јуну је у само два дана пала обилна количина падавина: око 150mm кише. Док у јулу је било повремених пљускова, а август је био сушан. У октобру је било обилнијих падавина. Децембар је био врло сушан и пало је мање од 1mm кише, а просјечна количина падавина у децембру је близу 200mm.

Све укупно количина падавина током цијеле године је била већа од просјека за 10%.



	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Сума
1981-2010	148.3	146.3	138.8	117.8	98.3	71.1	47.6	62.1	123.8	175.2	219.6	191.3	1540.2
2016	186.2	206.4	212.6	115.5	180.2	192.1	60.3	5.6	116.6	236.5	189.0	0.5	1701.5

Требиње



Почетком године у Требињу је било прилично падавина, поготово током прољећа када је у марту било много обилних падавина. У јуну је било пљускова и већи дио падавина се јавио у само два дана.

Током јула и августа било је сушно, а посебно током августа. У октобру је поново било обилних падавина.

Децембар је био врло сушан и падавина скоро да није ни било, а просјек за децембар износи чак 250mm. Јак антициклон се одржавао изнад већег дијела Европе током децембра и није дозвољавао да се формирају циклони у Средоземљу који уобичајено доносе обилне падавине у ове предјеле.



	Јан	Феб	Мар	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец	Сума
1981-2010	182.8	157.2	154.0	90.9	92.2	78.4	43.2	66.1	147.1	167.0	251.6	250.6	1681.1
2016	199.7	154.0	249.8	124.0	130.6	81.9	18.0	1.6	86.3	304.1	186.8	1.9	1538.7

Број дана са
снијегним покривачем


Снијега је било врло мало. Почетком јануара у току два дана пао је обилан снијег, али због топлог времена снијег се брзо отопио. У фебруару снијег је падао углавном на планинама и само понегдје у нижим предјелима.

На истоку и у вишим предјелима, снијег је понегдје падао крајем априла. Средином новембра мало снијега је пало на планинама, а падавине у децембру су биле врло ријетке.

[illegible]


Максимална висина снијега (cm)

Почетком јануара пао је обилан снијег, поготово на сјеверу и западу гдје је повремено било и јаких пљускова, а висина снијега је достигла скоро пола метра. На истоку је било мање снијега, чак ни на планинама није било пуно снијега. Због топлог времена снијег се брзо отопио и већи дио зиме је падала киша, а снијег само понегдје. Изненађење је био снијег крајем априла који је падао углавном на истоку и у вишим предјелима. У новембру је пало мало снијега на планинама, а у децембру су падавине биле врло ријетке.



Расподјела падавина по мјесецима 2016. године


Бања Лука



- Мјесец
- Јануар
 - Фебруар
 - Март
 - Април
 - Мај
 - Јун
 - Јул
 - Август
 - Септембар
 - Октобар
 - Новембар
 - Децембар


Расподјела падавина по мјесецима 2016. године

Приједор



Расподјела падавина по мјесецима 2016. године


Добој




Мјесец

- Јануар
- Фебруар
- Март
- Април
- Мај
- Јун
- Јул
- Август
- Септембар
- Октобар
- Новембар
- Децембар

Расподјела падавина по мјесецима 2016. године




Расподјела падавина по мјесецима 2016. године



Расподјела падавина по мјесецима 2016. године

Билећа




Мјесец

- Јануар
- Фебруар
- Март
- Април
- Мај
- Јун
- Јул
- Август
- Септембар
- Октобар
- Новембар
- Децембар

Расподјела падавина по мјесецима 2016. године

Требиње



Мјесец

- Јануар
- Фебруар
- Март
- Април
- Мај
- Јун
- Јул
- Август
- Септембар
- Октобар
- Новембар
- Децембар

Закључак

За разлику од претходних година током 2016. године није било опасних временских прилика које би могле да нанесу веће материјалне штете или угрозе људске животе.

Средња температура је била виша од просјека, највише због врло топлог почетка године. Зима 2015/2016. је била једна од најтоплијих зима икада.

Често је било обилних падавина, али није било поплава. Средином новембра Дрина се излила у току два дана али није било великих материјалних штета.

Почетком године било је обилних снијезних падавина, поготово на сјеверу и западу гдје је висина снијега достигла скоро пола метра. Због јаког југа снијег се брзо топио, а удари вјетра су понегдје нанели мању материјалну штету.

10. фебруара олујни јужни вјетар је захватио већину предјела, а у Бањалуци је измјерена брзина од чак 31.8 m/s (114.6 km/h). Ово је најјачи удар вјетра забиљежен у Бањалуци.

Фебруар је био врло топао, један од најтоплијих фебруара од кад се врше мјерења.

Прољеће је био промјенљиво уз честе падавине, а касни прољећни мраз који се јавио крајем априла узроковао је велику штету воћарским културама. На истоку није било јаког мраза, али је падао снијег који је такође донио штете.

Љето је било промјенљиво уз честу кишу, повремено је било и обилних падавина. За разлику од претходних година није било великих врућина, а температура није прелазила изнад 40 степени. Август је био свјежији у већини предјела осим на југу где је било претежно сунчано и топло.

Јесен је била просјечна по питању температуре, а падавине нису биле равномјерно распоређене. На југу и истоку је било обилних падавина, а у осталим предјелима нешто мање од просјека.

Децембар је био врло сушан и хладан. Ово је био један од најсушнијих децембара икада, а иста ситуација десила прошлог децембра, као и 2013. године, а прије тога 1972. године. У многим предјелима, поготово у равницама где се често задржавала магла, ово је био најхладнији децембар у посљедњих десет година.